Chap.6 : Raisonnements par récurrence

On suppose que l'ensemble des entiers naturels, noté $\mathbb{N}$, a été construit, que les entiers naturels peuvent être ordonnés, et que cet ordre possède les propriétés suivantes :

1. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un plus petit élément
2. Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ possède un plus grand élément
3. $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément

1 Illustrations du principe de récurrence

1.1 Sur des situations courantes

FIGURE 1 – Quelles sont les deux conditions pour que tous les dominos se renversent ?

FIGURE 2 – Si on peut accéder à une marche n_0 de l'escalier (*initialisation*) et si l'on sait passer d'une marche à la marche suivante (*hérédité*), alors on peut accéder à toute marche au-dessus de n_0

1.2 Sur un exemple mathématiques

On souhaite démontrer la propriété $\mathcal{P}$ suivante :

Pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a : $\sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Remarque 1.1. 1. Pour tout entier naturel n , $\sum_{k=0}^n k$ et $\frac{n(n+1)}{2}$ sont deux nombres. La propriété à démontrer est l'égalité de ces deux nombres quel que soit l'entier naturel n .

2. La propriété $\mathcal{P}$ est elle même constituée d'une infinité de sous propriétés : l'égalité pour $n = 0$, celle pour $n = 1$, pour $n = 2$, etc...
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{P}_n$ la propriété au rang n :

$$\sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Pour prouver que $\mathcal{P}$ est vraie, il faut prouver que $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \dots$ sont vraies.

3. Si on prend par exemple $n = 4$:

- $\sum_{k=0}^4 k = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10$
- $\frac{4(4+1)}{2} = \frac{20}{2} = 10$

$\mathcal{P}_4$ est donc vraie car $10 = 10$

2 La récurrence simple

2.1 Le principe de récurrence

Méthode 2.1. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Il s'agit de démontrer que, pour tous $n \geq n_0$, la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Pour cela, on procède en trois étapes :

- **Initialisation** : on démontre que la propriété $\mathcal{P}_{n_0}$ est vraie
- **Hérédité** : on montre que la propriété se transmet de proche en proche. Si, pour un certain entier n , $\mathcal{P}_n$ est vraie, alors $\mathcal{P}_{n+1}$ l'est également.

On suppose que la propriété $\mathcal{P}_n$ (hypothèse de récurrence), et on en déduit que la propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie. La propriété est alors dite **héréditaire**.

- **Conclusion** : on en déduit, par récurrence, que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Application 2.2. Montrons que pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Remarque 2.3. On peut utiliser un raisonnement par récurrence pour montrer des assertions de natures différentes telles :

- une formule : $\sum_{k=0}^n k = 0 + 1 + 2 \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- une inégalité : $\forall n \in \mathbb{N}$, si $n \geq 10$ alors $100n \leq 2^n$
- une affirmation : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $4^n - 1$ est divisible par 3

2.2 Applications

Application 2.4. Démontrer qu'à partir d'un certain rang n_0 à déterminer : $\forall n \geq n_0, 100n \leq 2^n$

Application 2.5. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $4^n - 1$ est divisible par 3

Application 2.6. Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$

3 Théorème de récurrence "double"

Théorème 3.1. Soit $\mathcal{P}_n$ une assertion dépendant d'un entier naturel n .
On suppose que :

- $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vraies ;
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$ sont vraies alors $\mathcal{P}_{n+2}$ l'est aussi

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Application 3.2. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n \end{cases}$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = n$

Application 3.3. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + 2^n$

Application 3.4. La célèbre suite de Fibonacci .

On pose $f_1 = f_2 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+2} = f_{n+1} + f_n$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n \geq 0$.

4 Théorème de récurrence "forte"

Théorème 4.1. Soit $\mathcal{P}_n$ une assertion dépendant d'un entier naturel n .

On suppose que :

- $\mathcal{P}_0$ est vraie ;
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, si $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_n$ sont vraies alors $\mathcal{P}_{n+1}$ l'est aussi

Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}_n$ est vraie.

Application 4.2. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + u_1 + \dots + u_n \end{cases}$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2^n$

Application 4.3. on pose $u_1 = 3$ et pour tout $n \geq 1$:

$$u_{n+1} = \frac{2}{n}(u_1 + u_2 + \dots + u_n)$$

1. Calculer u_2, u_3 et u_4 .
2. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $u_n = 3n$.